

Autor: Ana Raquel Marques, Catarina Silva, Carina Pereira

Última atualização: 2016/07/28

Palavras-chave: Tabagismo, Cessaç o tab gica, Produtos para a cessaç o tab gica, Produtos do tabaco, Sa de

Resumo

O tabaco   diretamente respons vel em 6 das 8 maiores causas de morte no mundo. O ideal   nunca ter fumado, mas se fuma est  sempre a tempo de deixar de o fazer.

Quanto mais cedo o fizer maior o seu benef cio.

N o   f cil deixar de fumar:   preciso pensar que o tabaco   um problema, que este problema tem soluç o, e que a soluç o passa primeiro pelo pr prio fumador e pela vontade com que assumir a resoluç o de deixar de fumar.

Depois poder  recorrer a um profissional de sa de que o poder  ajudar nesta caminhada.

Tabagismo ? como deixar de fumar

Caminhante, s o teus passos

*o caminho e nada mais;
Caminhante, n o h  caminho,
faz-se caminho ao andar.*

Ant nio Machado, s culo XX

Segundo o Inqu rito Nacional de Sa de de 2014, existem, em Portugal, cerca de 1,8 milh es de pessoas fumadoras com idade igual ou superior a 15 anos, a maioria do sexo masculino.

Fumar   a primeira causa evit vel de doena, incapacidade e morte prematura nos pa ses mais desenvolvidos, contribuindo para seis das oito primeiras causas de morte a n vel mundial.   das principais causas de cancro do pulm o, doena pulmonar obstrutiva cr nica, acidentes vasculares cerebrais e ataque card aco!

O ideal   nunca ter fumado, mas se fuma   importante para o bem da sua sa de deixar de fumar o mais cedo poss vel, evitando as complicaç es do tabaco.

O tabaco e a saúde: O tabaco é responsável por 6 das 8 principais causas de morte no mundo

Como deixar de fumar

Fumar é viciante e a decisão de parar é difícil, mas não impossível. Existem várias estratégias que podem ajudá-lo neste percurso.

É uma decisão individual que depende apenas do fumador.

Mas não tem que fazer o caminho inteiro sozinho: Há ajudas ao seu dispor tanto nos profissionais, como em medicamentos.

O primeiro passo é **escolher o dia D**, o **dia** em que **vai deixar de fumar!** Aproveite uma data especial, como a data do seu aniversário, a passagem de ano ou o aniversário de um familiar próximo.

Motive-se

Faça uma lista das razões pelas quais acha importante deixar de fumar:

- Melhorar a capacidade física
- Prevenir doenças causadas pelo tabaco
- Ter mais qualidade de vida
- Poupar dinheiro

Conheça os seus hábitos

Identifique as situações que desencadeiam o desejo de fumar (ex: café e bebidas alcoólicas) e planeie como lidar com elas

Evite ambientes com fumo e o convívio com outros fumadores

Partilhe a sua decisão:

- Comunique à família e amigos a sua decisão, pedindo compreensão
- Peça que evitem fumar na sua presença
- Peça que não lhe ofereçam cigarros
- Evite fumar o cigarro todo
- Pense antes de fumar se precisa mesmo desse cigarro

Prepare um ambiente 100% livre do tabaco:

- Remova de casa/carro/emprego todos os produtos relacionados com o tabaco
- Não guarde o ?último maço?

Sempre que tiver vontade de fumar:

- Respire fundo, a vontade de fumar vai sendo cada vez menor
- Pratique mais atividade física
- Pense sempre em coisas positivas
- Use técnicas de relaxamento
- Faça pequenas e várias refeições e lanches ao longo do dia (cenoura crua, pipocas sem açúcar e sal, bolachas de aveia caseiras, tomates cereja)
- Tente fazer algo que lhe dê prazer: tomar banho, ouvir música, ler um livro, ver um filme ou passear
- Utilize alternativas, como beber água, mascar chicletes, comer fruta
- Mantenha as mãos ocupadas, por exemplo, com uma caneta

Medicamentos que o podem ajudar

A medicação pode ser útil em quem fuma mais de **10 cigarros/dia**, desde que não apresente contraindicações. Existem várias opções disponíveis e um profissional de saúde poderá ajudá-lo a encontrar a melhor solução para si.

Existem no mercado três opções que poderão ser utilizadas como 1ª linha:

- Terapêutica de substituição da nicotina
- Vareniclina
- Bupropiona

1. Terapêutica de substituição da nicotina

O tratamento com os substitutos da nicotina inicia-se, geralmente, no dia escolhido para o abandono do tabaco e o fumador deve ser aconselhado a não fumar quando os utiliza. Muitas vezes é necessário associar vários substitutos para se conseguir uma eficácia. Informe-se sempre junto de um profissional de saúde.

Pastilhas de chupar

Gomas mastigáveis

Adesivos

Utilização	<ul style="list-style-type: none"> • Dissolver na boca durante 30 minutos • Não ingerir alimentos ou bebidas (apenas água) 15 minutos antes e durante utilização 	<ul style="list-style-type: none"> • Mastigar lenta e ciclicamente até sentir um sabor intenso • Parar de mastigar e manter junto à bochecha até diminuir o sabor • Recomeçar a mastigar e manter até 30 minutos, para absorção completa • Não ingerir alimentos ou bebidas (apenas água) 15 minutos antes e durante utilização 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar pela manhã na pele sem lesões, seca e com pouco pêlo • Em local com pouca gordura • Retirar ao deitar ou na manhã seguinte • Variar diariamente o local de aplicação
Como tomar?	<ul style="list-style-type: none"> • As pastilhas e as gomas só devem ser utilizadas quando tiver uma vontade muito grande de fumar, devendo escolher a dose de: <ul style="list-style-type: none"> ◆ ≤ 2 mg se fuma menos de 20 cigarros por dia ◆ ≥ 4 mg se fuma mais de 20 cigarros por dia • Utilize no máximo 8-12 unidades por dia e no máximo durante 8-12 semanas, diminuindo gradualmente a sua utilização 	<ul style="list-style-type: none"> • Existem 2 tipos de pensos: de 24h (boa opção quando tem uma intensa vontade de fumar nas 1as horas da manhã) ou de 16h (boa opção se existir dificuldade em dormir) • Utilize durante 8 a 12 semanas, diminuindo gradualmente a sua utilização 	
Efeitos adversos	<ul style="list-style-type: none"> • Irritação da boca e garganta • Indigestão • Soluços • Dor na face • Problemas da articulação temporomandibular 	<ul style="list-style-type: none"> • Irritação da boca e garganta • Aumento da salivação • Alterações digestivas ligeiras • Soluços 	<ul style="list-style-type: none"> • Irritação da pele e comichão • Pouco frequentes: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dores musculares ◆ Dores de cabeça ◆ Insónias ◆ Transpiração
Contra-indicações	(muito raras)	<ul style="list-style-type: none"> • Inflamação do esófago e 	<ul style="list-style-type: none"> • Doenças de pele generalizadas

- **Inflamação da garganta**
- **Problemas dentários**
- **Uso de próteses dentárias removíveis**
- **Problemas da articulação temporomandibular**
- **estômago**
- **Inflamação da boca**
- **Alergia ao adesivo**

2. Vareniclina e Bupropiona

Reduzem a urgência em fumar, os sintomas de abstinência e a sensação de satisfação associada ao fumo do cigarro.

Vareniclina

Bupropiona

Utilização	<ul style="list-style-type: none"> • Comprimidos • Ingerir com um copo de água e nunca em jejum • Início 7 dias antes do dia D, conforme o esquema: <li style="text-align: center;">• 	<ul style="list-style-type: none"> • Comprimidos • Ingerir com um copo de água • Início 7 dias antes do dia D, conforme o esquema: <li style="text-align: center;">•
Como tomar	<ul style="list-style-type: none"> • Deve ser utilizada isoladamente, devendo-se evitar a associação a outra medicação utilizada para a cessação tabágica • O tratamento tem duração de 8 a 12 semanas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pode ser utilizado em associação com a terapêutica de substituição da nicotina • O tratamento tem duração de 8 a 12 semanas
Efeitos adversos	<ul style="list-style-type: none"> • Náuseas • Dores de cabeça • Insônia e sonhos anormais • Efeitos raros <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tonturas, alteração do paladar, vômitos, obstipação, dispepsia, boca seca, apetite, ◆ Sonolência, fadiga ◆ Convulsões ◆ Alterações do humor ◆ Alterações cardíacas 	<ul style="list-style-type: none"> • Irritação da boca e garganta • Aumento da salivação • Alterações digestivas ligeiras • Soluços
Contra-indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Alergia ao medicamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Alergia ao medicamento

- **Insuficiência renal terminal**
- **Idade < 18 anos**
- **Gravidez e amamentação**
- **Inflamação da boca/esófago/estômago**
- **História de convulsões**
- **Tumor do sistema nervoso**
- **Doença psiquiátrica**
- **Bulimia ou anorexia nervosa**
- **Abstinência de álcool**
- **Cirrose hepática grave**
- **Idade < 18 anos**
- **Gravidez, amamentação**

Lembre-se que poderá procurar ajuda junto de um profissional de saúde! *Não tem de fazer esta caminhada sozinho.*

Conclusão

O tabaco atinge todos os órgãos do corpo e tem efeitos devastadores na saúde. Quanto mais cedo deixar de fumar, maiores serão os benefícios para si. *Você é capaz!*

Referências recomendadas

- Programa tipo de actuação na cessação tabágica da DGS, Dezembro 2007
- Prevenção e Controlo do Tabagismo em números ? 2014, Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo da DGS
- DGS ? Quer deixar de fumar?
- NHS - SMOKE FREE
- USA ? SMOKE FREE
- WHO report on the global tobacco epidemic, 2015

[Voltar à página inicial](#) [Tem alguma dúvida? Fale connosco](#) *****

[Ana Raquel Marques](#) • [Catarina Silva](#) • [Carina Pereira](#)